

Checkliste für Ihre Implantation

Verhalten vor und nach chirurgischen Eingriffen

Allgemeine Verhaltenshinweise: (bei JEDER Implantation)

1. Das Antibiotikum (i. d. R. Amoxicillin 1000 mg) 1 Tablette direkt **VOR** der Operation (zu Hause) einnehmen.
2. Die Mundspülung (Chlorhexamed 0,2% ohne Alkohol) einmal lange (ca. 30 sek.) **VOR** der OP (zu Hause) den Mundraum desinfizieren.
3. Ibuprofen 600 mg besorgen.
4. Das Antibiotikum **NACH** OP 3 x täglich für 3 Tage einnehmen.
5. Mundspüllösung **NACH** OP 3 x täglich (NUR Schwenken).
6. Ibuprofen **NACH** OP nach Bedarf einnehmen.

Sinus Lift:

1. Nasic für Kinder 3 Tage **VOR** OP ca. 3 x täglich benutzen.
2. Sinupret forte 5 Tage **VOR** OP 3 x täglich 1 Tablette.
3. Nasic für Kinder 10 Tage **NACH** OP 3 x täglich 1 Tablette
4. Sinupret forte 10 Tage **NACH** OP 3 x täglich 1 Tablette
6. **NICHT** die Nase schneutzen
7. Es kann Blut aus der Nase fließen (sies ist OP bedingt normal und ein Zeichen dafür, dass sich die Kieferhöhle reinigt)

Knochenaufbau:

1. Prothese **NICHT** tragen bis diese an neue Knochensituation angepasst ist!
2. Weiche Bahrung für ca. 3 Tage ggf. **NICHT** auf der operierten Seite kauen.

Pflege: ggf. eine sehr weiche Zahnbürste besorgen (z. B. von Meridol) und von "rot nach weiß" das Zahnfleisch bürsten.

Am OP Tag KEINE Haftcreme benutzen!

Wir wünschen Ihnen eine gute Erholungsphase und einen schnellen Heilungsverlauf!

Ihr Praxisteam

Lückenlos
Dr. med. dent. Julia Kühn